




# ATAL DATGYFLYRU



“Codwch, Gwisgwch a Chadwch Symud”

ATAL A NODI DATGYFLYRU	HYRWYDDO GWEITHGAREDDAU DEFNYDDIOL	RHEOLI HYDER	GWEITHREDIA GWYBYDDOL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A yw'r claf yn wynebu risg uchel o ddatgyflyru?</li> <li>• Beth yw lefel symudedd / rheolaeth ar y bledren a'r coluddyn/gweithrediad gwybyddol y claf?</li> <li>• A fu newid o ran lefel symudedd / rheolaeth ar y bledren a'r coluddyn / gweithrediad gwybyddol y claf?</li> <li>• A fu trafodaeth â'r claf a'r teulu/gofalwyr am yr hyn y gallant ei wneud i atal datgyflyru a pham y mae'n bwysig?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dylid galluogi ac annog cleifion i godi o'r gwely, eistedd mewn cadair a symud bob dydd os gallant wneud hynny yn glinigol</li> <li>• Dylid annog cleifion i ymolchi a gwisgo eu hunain pan fo hynny'n bosibl neu gyda chyn lleied o gymorth â phosibl</li> <li>• Dylai'r amgylcheddau clinigol annog gweithgarwch a symudedd (cadeiriau wrth erchwyn y gwely, coridorau'n cael eu cadw'n glir o annibendod.</li> <li>• Galluogi ac annog cleifion i symud i'r toiled a/neu'r ystafell ymolchi i ddefnyddio'r cyfleusterau</li> <li>• Annog cleifion i eistedd allan i gael cinio</li> <li>• Os bydd cleifion angen eu sbectol neu gymorth cerdded i symud, sicrhewch eu bod o fewn cyrraedd hwylus</li> <li>• Cefnogi cleifion i roi eu meddyginiaethau eu hunain yn ystod eu harhosiad fel claf mewnol a'u hannog i ddeall unrhyw newidiadau a wneir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dylid annog a chefnogi cleifion i ddefnyddio'r toiledau os ydynt yn glinigol yn gallu gwneud hynny</li> <li>• Dylid annog pobl i beidio â defnyddio padelli gwely a chomodau wrth erchwyn y gwely er mwyn sicrhau urddas cleifion ac annog symudedd.</li> <li>• Dylid annog cleifion sy'n ceisio gwella rheolaeth ar y coluddyn/pledren i beidio â defnyddio cynhyrchion anymataliaeth fel padiau – gan gynnwys yn ystod y nos</li> <li>• Annog a chefnogi maethiad a hydradiad da</li> <li>• Cofnodi symudiadau coluddyn ac atal, nodi a rheoli rhwymedd cyn gynted â phosibl</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canolbwyntio ar atal deliriwm</li> <li>• Sicrhau bod systemau ar waith i gyfeirio cleifion at yr amser, y dyddiad a'r diwrnod</li> <li>• Hyrwyddo sefydlu trefn ar gyfer y dydd a'r nos yn yr amgylchedd clinigol</li> <li>• Hyrwyddo gweithgareddau a fydd yn darparu ysgogiad gwybyddol a rhyngweithio cymdeithasol mewn meysydd clinigol</li> <li>• Gyda chaniatâd y claf, annog cynnwys teulu, ffrindiau a gofalwyr yn eu gofal i atal datgyflyru a deliriwm – adolygu amseroedd ymweld i hwyluso hyn</li> <li>• Annog a chefnogi maethiad a hydradiad da – monitro a chofnodi cymeriant</li> <li>• Dylid adolygu meddyginiaeth cleifion â newidiadau i weithrediad gwybyddol ar gyfer meddyginiaethau sy'n gysylltiedig â dirywiad gwybyddol.</li> <li>• Dylai cleifion â newid aciwt i weithrediad gwybyddol gael eu sgrinio am ddeliriwm</li> <li>• Dylai cleifion sy'n bositif ar gyfer deliriwm gael adolygiad meddygol a dylid rhoi cynllun rheoli cyffwrdd ar waith, gan gynnwys (lle mae technegau anffarmacolegol yn aneffeithiol) rheolaeth ffarmacolegol briodol.</li> </ul>



Cliciwch ar y ddolen i Nod 5 lle byddwch yn dod o hyd i'r prif ddogfennau

## MAE DATGYFLYRU YN DECHRAU O FEWN ORIAU – MAE EI ATAL YN FATER I BAWB

Mae datgyflyru yn broses gymhleth o newid ffisiolegol ar ôl cyfnod o anweithgarwch, bod yn y gwely neu ffordd o fyw nad yw'n cynnwys llawer o symud. Mae'n achosi colledion gweithredol mewn meysydd fel statws meddyliol, rhywfaint o anymataliaeth a'r gallu i gyflawni gweithgareddau byw bob dydd. (Gillis et al 2005)